

## Vaisto charakteristikos santrauka

### 1. Vaisto pavadinimas

**Hemorol<sup>®</sup>**

### 2. Kokybinė ir kiekybinė preparato sudėtis

Vienoje medicininėje žvakutėje yra:

- 50 mg *Chamomillae extr. spiss.* (sauso ramunių ekstrakto);
- 20 mg *Genistae scop. extr. spiss.* (sauso daržinių prožirnių ūglių ekstrakto);
- 20 mg *Hippocastani cort. extr. spiss.* (sauso paprastųjų kaštonų žievės ekstrakto);
- 20 mg *Belladonnae extr. spiss.* (sauso šunvyšnių ekstrakto);
- 20 mg *Tormentillae extr. spiss.* (sauso miškinių sidabražolių ekstrakto);
- 20 mg *Milefolii extr. spiss.* (sauso paprastųjų kraujažolių ekstrakto);
- 100 mg Anaesthesinum (anestezino);
- 150 mg Glycerolum (glicerolio).

### 3. Vaisto forma

Į tiesiąją žarną įkišamos medicininės žvakutės.

### 4. Klinikiniai duomenys

#### 4.1. Indikacijos

Tiesiosios žarnos veninio rezginio mazgai, lėtinis tiesiosios žarnos uždegimas, kraujavimas, venų sienelių pažeidimas, skausmą sukeliantis vidurių užkietėjimas. Be to, vaistas tinka įtrūkusiai tiesiosios žarnos gleivinei gydyti bei jos dirginimui mažinti.

*Pastaba.* Ar galima vartoti preparato, reikia pasiklausti gydytojo.

#### 4.2. Dozavimas

Prieš pradėdant vartoti vaisto, reikia pasiklausti gydytojo.

Suaugusiems žmonėms reikia vartoti prieš naktį vieną žvakutę. Jei liga sunkesnė, nurodytą dozę galima vartoti 2 – 3 kartus per dieną.

Vyresniems negu 6 metų vaikams rekomenduojama vartoti prieš naktį vieną žvakutę.

#### 4.3. Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas preparato sudėtyje esančioms medžiagoms (galima alerginė reakcija).

#### 4.4. *Atsargumas*

Jei hemorojaus mazgai dideli, maždaug 5 – 10 min., t.y. kol žvakutė ištirps, gali skaudėti išangės sritį.

#### 4.5. *Sąveika su kitais vaistais*

Nežinoma.

#### 4.6. *Vartojimas nėštumo ir žindymo laikotarpiu*

Ar vaisto vartoti nėščioms moterims ir žindyvėms galima, reikia pasiklausti gydytojo.

#### 4.7. *Poveikis gebėjimui vairuoti transportą ir prižiūrėti veikiančius mechanizmus*

Medikamentas yra saugus, jo neigiamo poveikio psichiniam bei fiziniam darbingumui, gebėjimui vairuoti automobilį ir prižiūrėti veikiančius mechanizmus nepastebėta.

#### 4.8. *Nepageidaujamas poveikis*

Preparatas nepageidaujamo poveikio nesukelia.

#### 4.9. *Perdozavimas*

Perdozavimo atvejų nežinoma

### 5. *Farmakologinės savybės*

*Farmakoterapinė grupė (ATC kodas)*

**C 05 AD**

#### 5.1. *Farmakodinaminės savybės*

Preparatas slopina patinimą ir uždegimą, gerina kraujo tekėjimą venomis, mažina kapiliarų pralaidumą, slopina kraujosruvų atsiradimą, šalina spazmus.

#### 5.2. *Farmakokinetinės savybės*

Duomenų nepateikta.

### 6. *Farmaciniai duomenys apie vaistą*

#### 6.1. *Sudėtis ir pagalbinės medžiagos*

50 mg *Chamomillae extr. spiss.* (sauso ramunių ekstrakto), 20 mg *Genistae scop.extr. spiss.* (sauso daržinių prožirnių ūglių ekstrakto), 20 mg *Hippocastani cort. extr. spiss.* (sauso paprastųjų kaštonų žievės ekstrakto), 20 mg *Belladonnae extr.spiss.* (sauso šunvyšnių ekstrakto), 20 mg *Tormentillae extr.spiss.* (sauso miškinių sidabražolių ekstrakto), 20 mg *Milefolii extr. spiss.* (sauso paprastųjų kraujažolių ekstrakto), 100 mg Anaesthesinum (anestezino), 150 mg Glycerolum (glicerolio) bei kietųjų riebalų tiek, kad preparato būtų 2 g.

#### 6.2. *Cheminis ir farmacinis nesuderinamumas*

Nežinomas.

### **6.3. Tinkamumo laikas**

3 metai

### **6.4. Laikymo sąlygos**

Preparatą reikia laikyti ne aukštesnėje kaip 20 ° C temperatūroje, vaikams neprieinamoje vietoje.

### **6.5. Pakuotė**

Kartoninė dėžutė, kurioje yra du kontūrinės pakuotės iš polichlorvinilo folijos lapeliai (viename lapelyje yra šešios 2 g žvakutės) ir informacija vartotojui.

### **6.6. Vartojimo instrukcija**

Medicininę žvakutę reikia įkišti į tiesiąją žarną. Suaugusiems žmonėms reikia vartoti prieš naktį vieną žvakutę. Jei liga sunkesnė, nurodytą dozę galima vartoti 2 – 3 kartus per dieną.

Vyresniems negu 6 metų vaikams rekomenduojama vartoti prieš naktį vieną žvakutę.

### **7. Gamintojas, registracijos pažymėjimo savininkas**

Wroclavo vaistažolių fabrikas "Herbapol"

Ul. Św. Mikołaja 65/68, 50 – 951 Wrocław, Lenkija

### **8. Registracijos pažymėjimo numeris**

### **9. Vaisto aprašo parengimo data**

Informacinis lapelis

### **Hemorol**

Į tiesiąją žarną įkišamos medicininės žvakutės

#### **Sudėtis**

Vienoje medicininėje žvakutėje yra: 50 mg *Chamomillae extr. spiss.* (sauso ramunių ekstrakto); 20 mg *Genistae scop. extr. spiss.* (sauso daržinių prožirnių ūglių ekstrakto); 20 mg *Hippocastani cort. extr. spiss.* (sauso paprastųjų kaštonų žievės ekstrakto); 20 mg *Belladonnae extr. spiss.* (sauso šunvyšnių ekstrakto); 20 mg *Tormentillae extr. spiss.* (sauso miškinių sidabražolių ekstrakto); 20 mg *Milefolii extr. spiss.* (sauso paprastųjų kraujažolių ekstrakto); 100 mg Anaesthesinum (anestezino).

#### **Poveikis**

Preparatas slopina patinimą ir uždegimą, gerina kraujo tekėjimą venomis, mažina kapiliarų laidumą ir kraujosruvas, sukelia baktericidinį poveikį ir šalina spazmus.

#### **Vartojimas**

Tiesiosios žarnos veninio rezginio mazgai, lėtinis tiesiosios žarnos uždegimas, kraujavimas, venų sienelių pažeidimas, skausmą sukeliantis vidurių užkietėjimas. Be to, vaistas tinka įtrūkusiai tiesiosios žarnos gleivinei gydyti bei jos dirginimui mažinti.

*Pastaba.* Ar galima vartoti preparato, reikia pasiklausti gydytojo.

#### **Dozavimas**

Jei nepaskirta kitaip, rekomenduojama vyresniems negu 6 metų vaikams ir suaugusiems žmonėms vartoti prieš naktį vieną žvakutę. Jei liga sunkesnė, suaugusiems žmonėms nurodytą dozę galima vartoti 2-3 kartus per dieną.

#### **Pakuotė**

12 žvakučių.

#### **Laikymo sąlygos**

Žvakutes reikia laikyti ne aukštesnėje kaip 20°C temperatūroje, vaikams neprieinamoje vietoje.