

*Informacinis lapelis. Prašom atidžiai perskaityti!*

## **AFLUBIN<sup>®</sup>**

Registracijos Nr.2000/7052/8

### **Sudėtis**

1 ml **AFLUBIN<sup>®</sup>** yra: *Gentiana* D1 0,01 ml, *Aconitum* D6 0,10 ml, *Bryonia* D6 0,10 ml, *Ferrum phosphoricum* D12 0,10 ml, *Acidum sarcolacticum* D12 0,10 ml.

Alkoholio kiekis – 43% (svoris tūryje).

1 ml = apie 25 lašus. Alkoholio kiekis 1 ml: apie 0,40 g.

### **Vaisto forma**

Homeopatinis preparatas.

Geriamieji lašai.

### **Pakuotė**

20ml, 50 ml, 100 ml.

### **Farmakologinė grupė, poveikio tipas**

Vaistai gripui panašioms infekcijoms ir peršalimo ligoms gydyti.

Labai specifinis **Aflubin<sup>®</sup>** sudedamųjų medžiagų, papildančių viena kitos poveikį ir sudarančių platų vartojimo indikacijų ratą, derinys, padidina vartojimo saugumą ir supaprastina gydymą.

### **Prekybos leidimo savininkas.**

R. Bittner GmbH, A-9344 Weitensfeld 183, Austrija.

### **Indikacijos**

Gripo ir gripui panašių ligų, peršalimo ligų gydymas. Išbandytas ir ypač sėkmingai **Aflubin<sup>®</sup>** naudojamas šios grupės ligų profilaktikai. **Aflubin<sup>®</sup>** tinka kojų skausmo malšinimui ir kitiems reumato pobūdžio simptomams gydyti.

### Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai vaisto medžiagai.

*Vartojimas nėštumo ir kūdikio žindymo laikotarpiu*

Nėra jokių duomenų apie galimą pavojų, kurį *Aflubin*<sup>®</sup> keltų nėštumo arba žindymo laikotarpiu. Tačiau vaistą nėštumo ir žindymo laikotarpiu galima gerti tik tuomet, kai gydytojas ar vaistininkas atidžiai įvertina jo keliamą pavojų.

### Ypatingi įspėjimai ir atsargumo priemonės vaisto vartojimo metu

Jeigu esate nėščia, pasakykite gydytojui.

*Aflubin*<sup>®</sup> sudėtyje yra apie 0,40g/ml alkoholio, dėl to jo negali vartoti polinkį alkoholizmui turintys pacientai.

**Vaistus laikyti vaikams neprieinamoje vietoje!**

### Sąveika su kitais vaistais

Sąveika su kitais vaistais taip pat pripratimo atvejų nežinoma.

### Dozavimas

Dozė reikėtų parenkti individualiai, įvertinus ligos ypatumus. Jei Jūsų gydytojas nenurodė kitaip, *Aflubin*<sup>®</sup> reikėtų vartoti pagal lentelėje nurodytą tvarką:

#### 1. Gydyimo pradžia (I ir II gydyimo dienos)

	Dozė	Vartojimas
Paaugliai ir suaugusieji	10 lašų	Pradėjus gydyti – gerti kas 30-60 min. (daugiausia 8 kartus per dieną).
Kūdikiai ir vaikai	5 lašai	Pradėjus sveikatai taisyti, dozė reikia sumažinti iki 3 kartų per dieną.

Jeigu ligos požymiai laikosi, toliau gydoma pagal kitos lentelės nuorodas:

#### 2. Gydyimo tąsa

	Dozė	Vartojimas
Paaugliai ir suaugusieji	10 lašų	3 kartus per dieną
Kūdikiai ir vaikai	5 lašai	3 kartus per dieną

### 3. Profilaktika

#### a. Planinė profilaktika prieš peršalimo ligų ar gripo sezoną

	Dozė	Vartojimas
Paaugliai ir suaugusieji	10 lašų	2 kartus per dieną 3 savaites.
Kūdikiai ir vaikai	5 lašai	2 kartus per dieną 3 savaites.

#### b. Ūmios būklės profilaktika – po smarkaus peršalimo arba bendravimo su sergančiuoju gripu

	Dozė	Vartojimas
Paaugliai ir suaugusieji	10 lašų	2 kartus per dieną 2 dienas.
Kūdikiai ir vaikai	5 lašai	2 kartus per dieną 2 dienas.

### **Vartojimas**

Norint, kad vaistas veiktų geriausiai, *Aflubin*<sup>®</sup> reikia išgerti mažiausiai 30 min. prieš valgi arba 1 valandą po valgio. Prieš nurydami, vaistą šiek tiek palaikykite burnoje. *Aflubin*<sup>®</sup> galima gerti neatskiestą arba atskiedus trupučiu vandens.

### **Šalutinis poveikis**

Iki šiol jokių duomenų apie šalutinį poveikį negauta. Jei atsiranda šalutinio poveikio požymių, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

### **Tinkamumo trukmė, laikymo sąlygos**

Pasibaigus tinkamumo laikui, vaistą vartoti draudžiama. Tinkamumo vartoti trukmė atspausdinta ant buteliuko etiketės ir dėžutės.

Kadangi *Aflubin*<sup>®</sup> sudėtyje yra vaistažolių ir kitokių natūralių medžiagų, gali skirtis jo skonis ir kvapas, atsirasti neryškus padrumstėjimas. Vaisto veiksmingumui tai įtakos neturi.

*Aflubin*<sup>®</sup> laikomas tamsioje patalpoje ir saugomas nuo tiesioginių saulės spindulių. Buteliuką reikia laikyti dėžutėje, ne didesnėje negu kambario (30°C) temperatūroje.

Teksto paskutinės peržiūros data  
2001 m. kovo mėn.

Jei Jums kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.